

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ:- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. - Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέρα αποκής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. "Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης".

Πρώτες βοηθείες – Αντίδοτο: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή τη ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με αφρόνικο νερό και σαπούνι. Εάν παρατητήσεις ερεθημάτων του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επικενθέστε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με αφρόνικο νερό για αρκετά λεπτά και συμβολουσεύτε σφραγίδα. Σε περίπτωση τοποθετήστε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατεύστε τον από υποθέματα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση υποψίας για δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση εισιτηρίου μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθρόπιο αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπτυξη. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπληματική θεραπεία. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηρίασης: (210) 7793777

ΜΗΝ ΡΥΠΑΝΙΣΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα και τη μη γεωργική γη.
Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - **-στοράς ή φύτευσης της προστατευμένης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το Nissin 4 OD, στον ίδιο αγρό την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασταρεί μόνο άραβδος. - **-στοράς ή φύτευσης των καλλιέργειων που ακολουθούν:** Για σπάρα χωματινού υπαριχού πρέπει να περάσουν τουλαχίστον 4 μήνες και οποιαδήποτε άλλης καλλιέργειας την επόμενη άνοιξη (1 έτος μετά) από την εφαρμογή του Nissin 4 OD και αφού προηγήσει βαθιά άρση. -**της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμογείτε το σκευασμά:** Είσοδος του εργάτη στην καλλιέργεια αφού στεγνώσει το φεκαστικό υγρό. **Φυτοτοξικότητα:** Το προϊόν να μη χρησιμοποιείται στα άραβδα που προστέπουν υπό stress γερασίας σε θερμοκρασίες πάνω από 25°C και κάτια από 10°C. Κατά την 1η - 2η εβδομάδα μετά την εφαρμογή είναι δυνατόν να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του καλαμποκιού. Το φανόμενο αυτό είναι συνάρτηση της χρησηποιουμένης δόσεως, είναι δε παρόducible. Δεν επηρέαζε την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε γλυκού καλαμποκιού καθώς και σε καλαμποκιού που προορίζεται για απορά. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** δεν ορίζεται (καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής). **Οδηγίες για την ασφαλή απόφαση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Η απόφαση/ καταστροφή του Nissin 4 OD, πρέπει να γίνεται σε υψηλόνιο που έχει κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του σκευασμάτος. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο φεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προπογιμένως με τρύπιμα, για τη διασφάλιση της μη περιεργείας χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευασμάτος:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο και σε θερμοκρασίες έως 20°C. Δεν συνιστάται η αποθήκευση του σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες.

1912

NISSHIN 4OD

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)

ΑΑΔΑ: 70035/08.04.2013

Εγγυημένη σύνθεση:

Nicosulfuron (Νικοσουλφουρό) 4 % β/ο (χημ.ομάδα πυριμιδινυλσουλφουνλουρία)

Βοηθ.ουσίες 95.52% β/β

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες αραβοσίτου

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ.

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιεχόμενο: 1 Λίτρο



1° χλμ. Λ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ.100, 19002, Παιανία,
Τηλ.: 210.68.00.900, info@hellafarm.gr , www.hellafarm.gr

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ : ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

Στόχος	Δόση (κ.εκ./ στρέμμα)	Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/ στρέμμα)	Χρόνος εφαρμογής
Αγρωστώδη ζιζάνια			20-40
Μουχρίτσα (Echinocloa crusgalli)	100 100-150		1-3 φύλλα 1-2 αδελφιά
Σετάριες (Setaria spp.)	100		2-4 φύλλα
Βέλιουρας (Sorghum halepense) α. από σπόρο β. από ρίζωμα	100 125-150		Μέχρι 8 φύλλα 10-20 εκ. ύψος
Πλατύφυλλα ζιζάνια	100		2-4 φύλλα
Βλήτα (Amaranthus spp.)			
Τάτουλας (Datura stramonium)	100-150		2-4 φύλλα

Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργητη περίοδο: 1.

Παραποτήσεις: 1) Οι εφαρμογές γίνονται στα 2-8 φύλλα της καλλιέργειας του αραβοσίτου, 2) Όταν έχουμε σταδιακή εμφάνιση των ζιζανίων στο χρόνο, συνιστώνται 2 εφαρμογές σε μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες, ως εξής: 1η εφαρμογή με δόση 100 κ.εκ/ στρέμμα και 2η εφαρμογή με δόση 50 κ.εκ/ στρέμμα.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος και με πίεση μικρότερη από 2,5Atm (40psi) με τα συνηθ.ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, με μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του φεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε ανάδευντας την συνιστώμενη δόση του σκευασμάτος. Συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό αναδεύντας συνεχώς.

Καθορισμός φεκαστικής: Ξεπλύνετε κάλα της φεκαστικά μέσα. Αν δε γίνεται αυτό ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί το φεκαστικό μέσο. Συνιστάται η χρήση αμμονικού διαλύματος 3% (1 λίτρο ανά εκατόλιτρο) μέχρις ότου απομακρυνθούν όλα τα ίχνη του σκευασμάτος. Τα στάδια τα καθαρισμού τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής: -Αδειάστε το νερό μέχρι τη μέση με καθαρό νερό και κάντε το να πέρασει μέσα από όλα τα μέρη του φεκαστικού (αντλία, φεκαστικό αυλό) και αδειάστε ξανά. -Ξαναγεμίστε το νερό με καθαρό νερό στο οποίο προσθέστε μισό λίτρο αμμονίας οικιακής χρήσης 3% ανά 100λιτρο. Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσα ολου του συστήματος "ψεκάζοντας" υπό συνεχή ανάδευτη, μεριχά μεριχά. Επαναλάβετε την ανώτερη διάδικτηα (προσθέτοντας πάλι αμμονία) αλλη μια φορά και ακόμη μια φορά χωρίς αμμονία. -Χρησιμοποιείστε το ίδιο διάλυμα για το ξέπλυμα δύο φορές των φίλτρων και των μπεκ τα οποία ξεπλύνεται με καθαρό νερό.

Τρόπος δράσης: Το nicosulfuron δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού.

Συνθηκαστικότητα: Να μην συνιστάται με όλα σκευάσματα. Να εφαρμόζεται μόνο του.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείεται: - Να αποφεύγεται η χρήση ολοκλήρου του φυτού του αραβοσίτου ως ζωτωροφή, πριν την οριμάνση του. - Μην ψεκάζετε όταν φυσεί και αντίθετα με την φορά του ανέμου - Μην διπλωφεκάζετε τα άκρα των ζωνών. "Κάτοχος του σήματος Nissin είναι η Ishihara Sangyo Kaisha Ltd"

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:
Βλέπε επί της συσκευασίας