

**ΜΟΡΦΗ:** Πυκνό διάλυμα (SL)

pH: 4,8

**ΣΥΝΘΕΣΗ:** Εκχύλισμα κυττάρων του μύκητα *Saccharomyces cerevisiae* Περιέχει 25,0 % ελεύθερα αμινοξέα\*

\* Λαμβάνονται από ζύμωση του μικροοργανισμού *Saccharomyces cerevisiae*, Περιέχει ολικό άζωτο (N) 5,2 %.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:** Το ΜΟΚΑ είναι υγρό βιοδιεγέρτης που βασίζεται σε εκχύλισμα ζυμομύκητα, διεγείροντας τα φυτά από το στάδιο της καρπόδεσης και μετά.

Η εφαρμογή του ΜΟΚΑ παρέχει πολλά πλεονεκτήματα, εξασφαλίζοντας την ομοιόμορφη παραγωγή και συγκομιδή των φυτών:

- Βελτιώνει την ανάπτυξη των φυτών κατά το αναπαραγωγικό στάδιο και αυξάνει την απόδοσή τους.
- Προωθεί την καρπόδεση και την ανάπτυξη των καρπών κατά τα στάδια της διάγκωσης και της ωρίμανσης.
- Βελτιώνει την ποιότητα των συγκομισμένων καρπών (μέγεθος, χρώμα, συνεκτικότητα).
- Αυξάνει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και την μετασυλλεκτική διάρκεια των συγκομισμένων καρπών.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

**ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:** Το προϊόν δεν ταξινομείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 (CLP)

**P102:** Κρατήστε το μακριά από παιδιά.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χειρίζεστε το προϊόν.

**SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό μετά την εφαρμογή κοντά σε επιφανειακά ύδατα, αποφύγετε τη ρύπανση μέσω συστημάτων αποστράγγισης από αγροκτήματα ή δρόμους).

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Το προϊόν παραμένει σταθερό για 24 μήνες από την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής όταν αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία, σε θερμοκρασία 20° C, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από ηλιακό φως, παγετό και ακραίες θερμοκρασίες (<4°C και> 30 °C).

Η ευθύνη του παρασκευαστή περιορίζεται στην προμήθεια του προϊόντος στη σφραγισμένη αρχική συσκευασία, στη χρήση σύμφωνα με τη συνιστώμενη δοσολογία για κάθε καλλιέργεια. Οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την αποθήκευση, το χειρισμό, και τη χρήση είναι ευθύνη του χειριστή

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κρατήστε το μακριά από παιδιά, ανεκπαίδευτο προσωπικό και ζώα.

# Moka®

## ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

Ειδικό σκεύασμα βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών - Προωθεί την θρέψη και την ανάπτυξη των φυτών

Εκχύλισμα κυττάρων του μύκητα *Saccharomyces cerevisiae*  
Περιέχει 25,0 % ελεύθερα αμινοξέα

Κυκλοφορεί για χρήση στην γεωργία, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Αρ.217217/2004 (ΦΕΚ Β' 35)

 **Agrauxine**  
by Lesaffre

7 Avenue du Grand Périgné -  
49070 Beaucouzé - FRANCE  
[www.agrauxine.com](http://www.agrauxine.com)

**Αριθμός παρτίδας:** Βλ. επί συσκευασίας  
**Ημ/α Παραγωγής:** Βλ. επί συσκευασίας

**ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ:**  
Agrauxine by Lesaffre

2814\_0220\_df



 **anthesis**  
Blooming together

**Διανέμεται από:**  
ANTHESIS ΕΠΕ  
Λεωφ. Κηφισίας 303  
14561 Κηφισία

T 210 8012367  
Φ 210 6233196  
E [info@anthesis.gr](mailto:info@anthesis.gr)

[www.anthesis.gr](http://www.anthesis.gr)

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1L**  
**ΒΑΡΟΣ: 1,2Kg**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Το ΜΟΚΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπαίθριες και σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, εφαρμόζεται με διαφυλλική εφαρμογή.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΔΟΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΡΜΟΓΩΝ	ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (BBCH)
Καρποφόρα λαχανικά (σολανώδη, κολοκυνθοειδή)	100-200ml / στρ	2 - 6	Από την καρπόδεση (BBCH 71) έως την ωρίμανση (BBCH85)
Φυλλώδη λαχανικά	100-200ml / στρ	1 - 3	Από την μεταφύτευση μέχρι την συγκομιδή
Φράουλα και μικρούς καρπούς	100-200ml / στρ	1 - 4	Από την καρπόδεση (BBCH 71) έως την ωρίμανση (BBCH85)
Αμπέλι	100-200ml / στρ	1 - 2	Από την καρπόδεση (BBCH 71) έως την ωρίμανση (BBCH85)
Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Εσπεριδοειδή, Ελιά Ακροδρυα, Αβοκάντο	100-200ml / στρ	1 - 2	Από την καρπόδεση (BBCH 71) έως την ωρίμανση (BBCH85)
Πατάτα	100-200ml / στρ	1 - 4	Κάθε 10 - 15 μέρες από την έναρξη της κονδυλοποίησης
Κρεμμύδι	100-200ml / στρ	1 - 4	Από το 5ο φύλλο έως την πλήρη διάγκωση του βολβού
Μηδική	100-200ml / στρ	1 - 4	7 με 15 μέρες πριν την κάθε κοπή
Χλοοτάπητας, Γκαζόν	100-200ml / στρ	1 - 8	Κάθε 7-15 ημέρες

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

Εφαρμόστε το προϊόν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του φυτού, αποφεύγοντας τις πιο θερμές ώρες τις ημέρας. Ανακινείστε πριν τη χρήση. Προετοιμασία του μείγματος:

- 1 - Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά τα 2/3 του όγκου του νερού που απαιτείται για την εφαρμογή
- 2 - Ξεκινήστε την ανάδευση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα ΜΟΚΑ
- 3 - Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό
- 4 - Διατηρήστε την ανάδευση έως το τέλος της εφαρμογής

**Συνδυαστικότητα:**

Το ΜΟΚΑ είναι συμβατό με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα) και λιπάσματα. Πριν από κάθε νέο συνδυασμό, προτείνεται να γίνεται δοκιμή. Σε περίπτωση αμφιβολίας επικοινωνήστε με τον διανομέα. Ο συνδυασμός πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις συστάσεις των επίσημων οδηγιών ορθής πρακτικής.