



500κ.εκ€

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009

Πυκνό διάλυμα (SL)
Εγγ. Σύνθεση: propamocarb 53% β/ο, fosetyl 31% β/ο
Βοηθ. ουσίες: 25,2% β/β

Δισυστηματικό Μυκητοκτόνο
με προστατευτική δράση

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος
για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΕΒΙΚΟΥΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΣΛ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Δισυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση. Το propamocarb hydrochloride παρουσιάζει μικρή δισυστηματική κίνηση και η δράση του φαίνεται να επηρεάζει το σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών με συνέπεια την παρεμπόδιση της μυκηλιακής ανάπτυξης καθώς και της παραγωγής και θλάσης των σπορίων του περονόσπορου. Το fosetyl-MI παρουσιάζει συμπληρωματική και αποτρίπτική κίνηση και δρα παρεμποδίζοντας τη θλάση των σπορίων αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί στο σπορέιο, εφαρμογές με πότισμα, ψεκασμοί φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού διαλύματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΣΤΟΧΟΣ- ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Σπορεία: Τομάτα, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Πεπόνι, Μαρούλι: Πύθιο (*Pythium spp.*). Εφαρμογές στο σπορέιο. **Δόση:** 3 κ.εκ. σκευάσματος / τετραγωνικό μέτρο. **Όγκος νερού:** 2 λίτρα νερό / τετραγωνικό μέτρο.

Σπορεία: Πιπεριά: Πύθιο (*Pythium spp.*). Εφαρμογές στο σπορέιο. **Δόση:** 6 κ.εκ. σκευάσματος / τετραγωνικό μέτρο. **Όγκος νερού:** 2 λίτρα νερό / τετραγωνικό μέτρο.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. • Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε εμφανισιακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τομάτα (Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγούρι (Θ), Πεπόνι (Θ): Πύθιο (*Pythium spp.*). Ριζοτίτση. **Δόση:** 300 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος νερού:** 300 λίτρα νερό / στρέμμα.

Μαρούλι (Α): Περονόσπορος (*Betula lactucae*). Πρωτογενικό ψεκαστικό εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενών. **Δόση:** 250 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. **Όγκος νερού:** 40 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος / στρέμμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: **Σπορεία:** Τομάτα, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Πεπόνι, Μαρούλι: 2 εφαρμογές. Μία εφαρμογή μετά τη σπορά και μία εφαρμογή μετά τη θλάση των σπορίων (μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες).

Σπορεία: Πιπεριά: 1 εφαρμογή.

Θερμοκηπίου: Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, Πεπόνι: α) Καλιέργεια στο έδαφος 2 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες, β) Καλιέργεια σε τεχνητά υποστρώματα: 4 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες.

Μαρούλι (Α): Δύο εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Εφαρμογές με ριζοτίτση: Τομάτα (Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγούρι (Θ): 3 ημέρες.

Εφαρμογές με ριζοτίτση: Πεπόνι (Θ): 14 ημέρες.

Ψεκασμοί φυλλώματος: Μαρούλι (Α): 21 ημέρες.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Λογανικά με βρώσιμη ρίζα και λαχανικά του γένους *Allium* που προσίζονται για την διατροφή ανθρώπων και ζώων μπορούν να φυτευτούν ή να σπαρουν στο ίδιο υπόστρωμα μετά την πάροδο 120 ημερών από την τελευταία εφαρμογή. Κηπευτικά φυλλώδη κηπευτικά με στέλεχος, καρποφόρα κηπευτικά και σταυρανή μπορούν να φυτευτούν ή να σπαρουν μετά την πάροδο 60 ημερών από την τελευταία εφαρμογή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό εάν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες), ξεπλένονται υπό πίεση με καταλληλό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τριπτηθούν προηγούμενος, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνεται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Δύο χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία, σε μέρος δροσερό, μακριά από το ηλιακό φως και σε θερμοκρασία δωματίου.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Πρώτες Βοήθειες

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: Μεταφέρουμε τον πάσχοντα σε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρήσουν, καλέστε γιατρό (βλέπε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). Αφαίρεστε αμέσως τα ρούχα που έχουν βραχεί με το σκεύασμα.

• **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα** πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επικοινωνήστε γιατρό. • **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια** ξεπλύνετε τα μάτια πολύ καλά με νερό και καλέστε αμέσως γιατρό. • **Σε περίπτωση κατάποσης** μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και καλέστε αμέσως γιατρό. Να λαμβάνεται ενεργός άνθρακας. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Για το γιατρό: Συμπτώματα: ακαμψία, υπνηλία, δυσκολία συντονισμού κινήσεων, σπασμοί, τοπική υπερευαίσθησία. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Σε περίπτωση κατάποσης μεγάλης ποσότητας του σκευάσματος συστήνεται πλήξη στομάχου και χορήγηση ενεργού άνθρακα και συγχρόνως προστασία των αναπνευστικών οργάνων.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

GR80212070D

Bayer

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropsscience.gr



400

300

200

100