CORTEVA™ agriscience

Tracer™ 24 SC

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Πυκνό εναιώρημα (SC) **Εγγυημένη σύνθεση:** Spinosad: 2.4 % β/ο
Βοηθ. ουσίες: 97.2 % β/β

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προληπτική και θεραπευτική δράση

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
- Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Α.Α.Δ.Α.: 14749/ΕΡ-23.06.2020

Κάτοχος της Άδειας- Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ύβρας 2 και Λ. Κηφισίας 280
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: +302106889700

Περιεχόμενο: **100 κ.εκ.**

™* Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μην αδειάζετε τη συσκευασία, και το νερό του ξεπλύματος του ψεκαστήρα, στο νεροχύτη, στις υδρορροές ή σε οποιαδήποτε άλλο σημείο ροής νερού. Φοράτε γάντια κατά τη χρήση.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΓΕΝΙΚΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθάνεθε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε αμέσως το μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε τα μάτια, κρατώντας τα βλέφαρα χωριστά και αφού απομακρύνετε πριν τους φακούς επαφής, με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και χορηγήστε μεγάλες ποσότητες νερού. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών εφαρμόστε το τουλάχιστον **5 μέτρα** μακριά από επιφανειακά νερά, (πηγάδια, λιμνούλες, ρυάκια, ποτάμια).
Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Μην εφαρμόζετε όταν είναι παρόντα έντομα επικονίασης όπως μέλισσες ή βομβίνοι.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Το spinosad είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προληπτική και θεραπευτική δράση για την αντιμετώπιση φυλλοφάγων εκμπτών.

Το spinosad δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων δεσμεύοντας τους υποδοχείς της ακετυλχολίνης και προκαλεί παρατεταμένη ενεργοποίηση τους, εξαιτίας της οποίας το έντομο παραλύει λόγω νευρομυϊκής κόπωσης. Η παράλυση είναι μη αναστρέψιμη και ο θάνατος των εντόμων επέρχεται μέσα σε 3 ημέρες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες γιατί εφαρμόζεται στις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΕΣ

Ημ/νία παρασκευής / Αριθμός παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος της φιάλης

1301

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Αγκινάρα (Υ): Για την καταπολέμηση των: Πράσινο σκουλήκι, Θρίπτες. **Δόση:** 4 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τετρ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.3 - 1 λίτρα/ 10 τετρ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το στάδιο του πρώτου πραγματικού φύλλου μέχρι την εμφάνιση των πρώτων ανθέων. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 1-3 ανά 14 ημέρες.

Κεφαλωτές κράμβες (Υ): Λάχανο, Λαχανάκι Βρυξελλών: Για την καταπολέμηση των: Θρίπτες, Μαμέστρα. **Δόση:** 4 κ.εκ./1 Λίτρο ψεκ. υγρού/10 τετρ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.2-1 Λίτρα / 10 τετρ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του πρώτου πραγματικού φύλλου μέχρι τον σχηματισμό του κεφαλιού. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 1-2 ανά 10 ημέρες.

Ανθοκράμβες (Υ): Μπρόκολο, Κουνουπίδι: Για την καταπολέμηση των: Θρίπτες, Μαμέστρα. **Δόση:** 4 κ.εκ./1 Λίτρο ψεκ. υγρού/10 τετρ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.2-1 Λίτρα / 10 τετρ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του πρώτου πραγματικού φύλλου μέχρι τον σχηματισμό του κεφαλιού. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 1-2 ανά 10 ημέρες.

Αγγούρι (Υ+Θ), Κολοκυθάκι (Υ+Θ), Αγγουράκι (Υ+Θ): Για την καταπολέμηση των: Πράσινο σκουλήκι, Σπαντόπτερα, Θρίπτες. **Δόση:** 4 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τετρ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.3-1 λίτρα / 10 τετρ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του 4ου φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 2 ανά 7 ημέρες.

Καλλωπιστικά (Θ): Για την καταπολέμηση των θρίπων. **Δόση:** 4 κ.εκ./1 Λίτρο ψεκ. υγρού/10 τετρ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.4-1 λίτρα / 10 τετρ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Με την εμφάνιση των πρώτων φύλλων – κατά την περίοδο όπου τα φυτά αναπτύσσονται (Μάρτιος έως Οκτώβριος). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 2 ανά 7 ημέρες.

Αρωματικά φυτά και βρώσιμα άνθη (Υ): Βασιλικός, Σέλινο, Άνηθος, Εστραγκόν, Φασκόμηλο, Θυμάρι, Σχοινόπρασο, Δάφνη, Δεντρολίβανο: Για την καταπολέμηση των: Πράσινο σκουλήκι, Σπαντόπτερα, Θρίπτες. **Δόση:** 4 κ.εκ./1 Λίτρο ψεκ. υγρού/10 τετρ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.2-1 Λίτρα / 10 τετρ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων μέχρι και πριν την άνθηση. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 2 ανά 7 ημέρες.

Φράουλα (Υ): Για την καταπολέμηση των: Πράσινο σκουλήκι, Σπαντόπτερα, Δροσόφυλλα, Θρίπτες. **Δόση:** 4 κ.εκ./1 Λίτρο ψεκ. υγρού/10 τετρ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.2-1 Λίτρα / 10 τετρ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του 4ου φύλλου μέχρι και τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 2 ανά 7 ημέρες.

Φασόλι και αρακάς με λοβό, φρέσκος (Υ): Για την καταπολέμηση των: Πράσινο σκουλήκι, Σπαντόπτερα. **Δόση:** 4 κ.εκ./1 Λίτρο ψεκ. υγρού/10 τετρ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.2-1 Λίτρα / 10 τετρ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι το πλήρες μέγεθος του λοβού. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 1-2 ανά 7 ημέρες.

Φασόλι και αρακάς με λοβό, φρέσκος (Υ+Θ): Για την καταπολέμηση των: Πράσινο σκουλήκι, Σπαντόπτερα, Θρίπτες. **Δόση:** 4 κ.εκ./1 Λίτρο ψεκ. υγρού/10 τετρ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.1-0.4 Λίτρα / 10 τετρ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του 5ου φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 1-2 ανά 7 ημέρες.

Μαρούλια και άλλες σαλάτες (Υ+Θ): Μαρούλι (Υ+Θ), Λικοπέρδολο (Υ+Θ), Σκαρόλα (Υ+Θ), Ρόκα (Υ+Θ): Για την καταπολέμηση των: Πράσινο σκουλήκι, Σπαντόπτερα, Θρίπτες. **Δόση:** 4 κ.εκ./1 Λίτρο ψεκ. υγρού/10 τετρ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.2-1 λίτρα/ 10 τετρ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι που η κεφαλή φτάνει το επιθυμητό μέγεθος. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 2 ανά 7 ημέρες.

Γλυκό καλαμπόκι: Για την καταπολέμηση των: Πράσινο σκουλήκι, Πυραλίς. **Δόση:** 4 κ.εκ./1 Λίτρο ψεκ. υγρού/10 τετρ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.1-0.4 Λίτρα / 10 τετρ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του τέταρτου φύλλου μέχρι το στάδιο όπου οι στάρι στο μέσον του σπάδικα αποκτούν κιτρινο-άσπρο χρώμα, το περιεχόμενο τους είναι γαλακτώδες και η περιεκτικότητα τους σε ξηρή ουσία φτάνει το 40%. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 1-2 ανά 21 ημέρες.

Πεπόνι (Υ+Θ), Καρπούζι (Υ+Θ): Για την καταπολέμηση των: Πράσινο σκουλήκι, Σπαντόπτερα, Θρίπτες. **Δόση:** 4 κ.εκ./1 Λίτρο ψεκ. υγρού/10 τετρ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.3-1 λίτρα / 10 τετρ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του τέταρτου φύλλου μέχρι την ωρίμανση του καρπού. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 2 ανά 7 ημέρες.

Πιπεριές (Υ+Θ): Για την καταπολέμηση των:
- Πράσινο σκουλήκι, Σπαντόπτερα, Δορυφόρος, Τούτα. **Δόση:** 3 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τετρ. μέτρα.
- Θρίπτες. **Δόση:** 4 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τετρ. μέτρα.

Όγκος ψεκ. υγρού: 0.2-1 λίτρα / 10 τετρ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την εμφάνιση του τέταρτου φύλλου μέχρι και την ωρίμανση του καρπού. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 2 ανά 7 ημέρες.

Πατάτα: Για την καταπολέμηση του Δορυφόρου. **Δόση:** 1.5 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τετρ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.2-1 λίτρα/ 10 τετρ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το στάδιο του πρώτου φύλλου μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των 9 πρώτων φύλλων μέχρι την ωρίμανση του κονδύλου. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 1-2 ανά 10 ημέρες.

Τομάτα (Υ+Θ): Για την καταπολέμηση των:
- Πράσινο σκουλήκι, Σπαντόπτερα, Τούτα. **Δόση:** 3 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τετρ. μέτρα.
- Θρίπτες. **Δόση:** 4 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τετρ. μέτρα.
- Δορυφόρος. **Δόση:** 1.5 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τετρ. μέτρα.

Όγκος ψεκ. υγρού: 0.2-1 λίτρα / 10 τετρ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το τέταρτο φύλλο μέχρι και την ωρίμανση. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 2 ανά 7 ημέρες.

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Για την καταπολέμηση των: Ευδεμίδα, Κοχυλίδα, Πυραλίδα, Δροσόφυλλα. **Δόση:** 2 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού/10 τετρ. μέτρα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 0.15–0.6 λίτρα / 10 τετρ. μέτρα. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το δεύτερο φύλλο μέχρι το μαλάκωμα της ράγας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα:** 1-2 ανά 14 ημέρες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (σε ημέρες):

Καλλωπιστικά: **-**

Κεφαλωτές κράμβες (Λάχανο, Λαχανάκι Βρυξελλών) (Υ), Ανθοκράμβες (Μπρόκολο, Κουνουπίδι) (Υ), Αγγούρι (Υ+Θ), Αγγουράκι (Υ+Θ), Κολοκυθάκι (Υ+Θ), Αρωματικά φυτά και βρώσιμα άνθη (Βασιλικός, Σέλινο, Άνηθος, Εστραγκόν, Φασκόμηλο, Θυμάρι, Σχοινόπρασο, Δάφνη, Δενδρολίβανο) (Υ), Φράουλα (Υ), Μαρούλια και άλλες σαλάτες (Μαρούλι, Λικοπέρδολο, Σκαρόλα, Ρόκα) (Υ+Θ), Τομάτα (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ+Θ), Καρπούζι (Υ+Θ), Πιπεριές (Υ+Θ): **3**

Αγκινάρα (Υ), Φασόλι και Αρακάς με λοβό, φρέσκος (Υ+Θ), Πατάτα: **7**

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες), Γλυκό καλαμπόκι: **14**

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μέχρι ναέχει πλήρως στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Συσκευασία με ενσωματωμένο δοσομετρητή:

- Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν την χρήση.
- Ξεβιδώνετε το καπάκι ασφαλείας για τα παιδιά.
- Για να ρίξετε την επιθυμητή δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο χρησιμοποιείστε το ειδικό δοσομετρικό δοχείο που θα βρείτε ενσωματωμένο στη συσκευασία.
- Ξεπλύνετε το δοσομετρικό με λίγο νερό που θα το ρίξετε στο ψεκαστικό σας δοχείο και βάλτε το στη θέση του αφού βιδώσετε ξανά τη συσκευασία, για περαιτέρω χρήση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

1. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
2. Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό.
3. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.
4. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα ανθοκομικών ή πράσινων καλλωπιστικών ή φυτωρίων δέντρων, θάμνων και καλλωπιστικών ως τροφή ή ζωοτροφή.
5. Να εφαρμόζεται σε στεγνά φύλλα.

Διαχείριση Ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική **spinosad**, η οποία ανήκει στην **ομάδα 3** κατά IRAC.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται :

- η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- να ακολουθείται ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών που αναφέρεται στην ετικέτα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Το παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμβουλευτικό εργαλείο. Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.