



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει Pendimethalin και 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την εφαρμογή.

Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την ανάμειξη/φόρτωση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποθεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Πλένετε όλα τα προστατευτικά ενδύματα μετά τη χρήση.

Pendigan® 40sc

Pendimethalin (Πεντιμεθαλίν) 40%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πηλατύφυλλων ζιζανίων κατά το φύτευμά τους, σε διάφορες καλλιέργειες. Εφαρμόζεται και ως αντιφυλλοξιδικό καπνού.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Pendimethalin40% β/ο

Βοηθητικές ουσίες62,07% β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

A.A.Δ.Α.: 70208/03.04.2017

Αριθμός Παρτίδας:	ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία παραγωγής:	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



Κάτοχος της Άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων, συμπεριλαμβανομένης μιας φυτικής ζώνης ανάσχεσης πλάτους 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού, μια απέκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων συμπεριλαμβανομένης μιας φυτικής ζώνης ανάσχεσης πλάτους 10 μέτρων για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών, μια απέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων για τις καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων και των μηλοειδών και μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για όλες τις άλλες καλλιέργειες από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής, απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

01/A/2018-2



**ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**



ΠΕΝΤΙΓΚΑΝ 40:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και ηλιετούφυλλων ζιζανίων κατά το φύτευμά τους, σε διάφορες καλλιέργειες. Εφαρμόζεται και ως αντιφυλλήζακο καπνού. Στο βιομηχανικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής ατράκτου. Δρα δι' επαρκής και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μασοχαλιών οφθαλμών-φυλλήζων, που ακολουθεί το κορυφολόγημα των αμερικανικών κανών Μπέρντσευ και Βιρτζίνια.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια, προσαρτάκι με ενσωμάτωση, προφυτρωτικά, επιφανειακά ή χωρίς μεταφυτρωτικά. Στην επιφανειακή εφαρμογή, αν δεν βρέξει μέσα σε 5-6 ημέρες χρειάζεται πότισμα. Επίσης εφαρμόζεται ως αντιφυλλήζακο καπνού ψεκάζοντας τα κορυφοληγμένα καπνόφυτα. Χρησιμοποιείται μεκ τύπου σκούλας και ψεκάστε με πίεση ψεκαστικού μικρότερη από 3-4 ατμόσφαιρες (45-60 psi).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα ακευαυμάτου στο ψεκαστικό δοχείο αναδευόμενος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του ακευαυμάτου. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρείς (3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΣΤΡΕΡΔΙΟΕΙΔΗ-ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΤΙΑ (Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερκοκιά-Δαμασκηνιά-Κερασιά)-ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά-Μουσομυλιά): Ετήσια αγρωστωδών και ηλιετούφυλλα ζιζάνια. Δόση: 300-500 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικών των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των δένδρων (πριν την άνοιξη). **ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια & οινολοίσιμα σταφύλια):** Ετήσια αγρωστωδών και ηλιετούφυλλα ζιζάνια. Δόση: 300-500 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικών των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης, το χειμώνα (στο τέλος του χειμερινού ήλιθθου, πριν την έναρξη της βλάστησης). **ΣΚΟΡΔΑ:** Ετήσια αγρωστωδών και ηλιετούφυλλα ζιζάνια. Δόση: 300-500 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή χωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας (στάδιο μαισίτιου). **ΑΓΚΙΝΑΡΑ:** Ετήσια αγρωστωδών και ηλιετούφυλλα ζιζάνια. Δόση: 250-400 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή πριν την μεταφύτευση με ενσωμάτωση ή σε εγκατεστημένη φύτευα κατά την περίοδο του ήλιθθου, πριν την νέα ανάπτυξη, σε γυμνό έδαφος πριν την εμφάνιση ζιζανίων. **ΣΕΛΙΝΟ-ΛΑΧΑΝΟ-ΜΠΡΟΚΟΛΟ-ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ:** Ετήσια αγρωστωδών και ηλιετούφυλλα ζιζάνια. Δόση: 250-400 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση. **ΚΡΕΜΜΥΔΙ (από σπόρο):** Ετήσια αγρωστωδών και ηλιετούφυλλα ζιζάνια. Δόση: 250-400 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή χωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας (στο στάδιο της μαισίτιου). **ΚΡΕΜΜΥΔΙ (μεταφύτευόμενο):** Ετήσια αγρωστωδών και ηλιετούφυλλα ζιζάνια. Δόση: 250-400 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση. **ΦΡΑΟΥΛΙΑ:** Ετήσια αγρωστωδών και ηλιετούφυλλα ζιζάνια. Δόση: 300-500 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας ή σε εγκατεστημένη φύτευα κατά το ήλιθθου. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Ετήσια αγρωστωδών και ηλιετούφυλλα ζιζάνια. Δόση: 300-500 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή προσαρτάκι με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **ΣΠΑΡΑΓΓΙ-ΗΛΙΑΝΘΟΣ-ΣΟΓΙΑ-ΑΡΑΧΙΔΑ*-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ-ΜΠΙΖΕΛΙ-ΦΑΣΟΛΙ-ΠΑΤΑΤΑ:** Ετήσια αγρωστωδών και ηλιετούφυλλα ζιζάνια. Δόση: 300-500 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά τη σπορά). **ΦΑΚΗ*-ΦΑΒΑ*-ΡΕΒΙΘΙ*-ΚΟΥΚΙΑ*:** Ετήσια αγρωστωδών και ηλιετούφυλλα ζιζάνια. Δόση: 300 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά τη σπορά). **ΤΟΜΑΤΑ-ΜΠΑΜΙΑ*:** Ετήσια αγρωστωδών και ηλιετούφυλλα ζιζάνια. Δόση: 250-400 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση. **ΠΙΠΕΡΙΑ:** Ετήσια αγρωστωδών και ηλιετούφυλλα ζιζάνια. Δόση: 300-500 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση. **ΡΑΔΙΚΙ*-ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ*-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ* (φυλλά): Σέλινο-Μαράθο-Κόλιανδρο-Φινόκο-Ανθός):** Ετήσια αγρωστωδών και ηλιετούφυλλα ζιζάνια. Δόση: 250-400 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά τη σπορά). **ΣΠΑΡΑΓΓΙ*:** Ετήσια αγρωστωδών και ηλιετούφυλλα ζιζάνια. Δόση: 300-500 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή προφυτρωτικά: α) είτε στην επιφάνεια του σμαριών μετά την κατασκευή τους, πριν την κάλυψη με πλάστικο, β) είτε στην επιφάνεια του ισοπεδωμένου εδάφους (μετά το τέλος της συγκομιδής και την καταστροφή των σμαριών), το αργότερο μέχρι τέλη Ιουλίου. **ΚΑΡΟΤΟ*:** Ετήσια αγρωστωδών και ηλιετούφυλλα ζιζάνια. Δόση: 300-500 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά τη σπορά). **ΚΑΠΝΟΣ (σαν αντιφυλλήζακο των Αμερικανικών κανών Μπέρντσευ και Βιρτζίνια):** Παρεμπόδιση ανάπτυξης μασοχαλιών οφθαλμών-φυλλήζων. Δόση: 300 κ.εκ./στρ. Στις αρχές της άνοιξης αφού κορυφοληγθούν τα κωνά αρκετά χαμηλά, ψεκασμό με 20 κ.εκ. ψ.υ./φυτό, διαλύματος 10 κ.εκ. προϊόντος/λίτρο. **ΚΑΠΝΟΣ (σαν ζιζανιοκτόνο):** Ετήσια αγρωστωδών και ηλιετούφυλλα ζιζάνια. Δόση: 300-500 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή πριν ή μετά τη μεταφύτευση ανάμεσα στις γραμμές μετά το τελευταίο παράχωμα και χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των φυτών. **ΚΑΛΜΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ*:** Ετήσια αγρωστωδών και ηλιετούφυλλα ζιζάνια. Δόση: 250-300 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικών των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης μετά την μεταφύτευση, σε καλά εγκατεστημένες φύτευες.

*Χρήση πόσων σμασιών.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-60 λίτρα/στρέμμα.

Μείγνος αριθμός εφαρμογών/καλλιηρηγτική περίοδο: Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις:

1) Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων, που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **Pendigan® 40SC**. 2) Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά έδαφη - χαμηλής περικοτικότητα σε οργανική ουσία και μικρότερη πίεση προσβολής, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά έδαφη - μέσης έως υψηλής περικοτικότητας σε οργανική ουσία ή/και μεγαλύτερη πίεση προσβολής. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιηθούν οι μέγιστες δόσεις, και ανάλογα με τη σύσταση/υγραμότητα του εδάφους, είναι δυνατό να παρατηρηθεί παροδική καθυστέρηση ανάπτυξης των φυτών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής εδαφικής υγρασίας ή/και χαμηλών θερμοκρασιών. 3) Η δράση του ακευαυμάτου στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές πότισμα 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση - «ενεργήση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος. 4) Το ακευαυμάτο καταπολεμεί το ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρισκόνται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα-κοτυληδόνας). Εφόσον υπάρχουν φυτωρέμενα ζιζάνια θα πρέπει προηγουμένως να καταστραφούν με σκόλημο ή βοτάνιομα ή με κατάλληλο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο. 5) **Ετήσια Αγρωστωδών Ζιζάνια: Ευαίσθητα Ζιζάνια:** Αιματόχορτο, Μουχρίτσα, Ήρα, Πράσιν Σετόρι. 6) **Ετήσια Ηλιετούφυλλα Ζιζάνια: Ευαίσθητα Ζιζάνια:** Βήητο, Πίλαγιστό Βήητο, Τραχύ βήητο, Αναγαλής, Λουβουδί, Αγριομαργαρίτα, Αγρία Ρόκα, Αγριοδρόσου, Χαμομήλι, Παπαρούνα κοινή, Φάθαρος, Πικρία, Πολυκόμπος, Γλυστρίδα, Άγριο σιτάνη, Ήμερο σιτάνη, Στύρονος, Ζωός, Σιόμιορη, Βερκόνια. **Μετρώς ευαίσθητα:** Καπνόχορτο, Αγριονιπέρη, Αψιμόρι. 7) **Προτεινόμενα είδη καλλιηρηγτικών φυτών:** Τούγια, είδη *Prunus* σπ., Κουρπεσκούπικος, Βιθύουρο, Κράταινος, Ήμερο πουρνάρι, Παοχαλιά, Μαυριά, Δρυς, Φοίνικας, Πεύκο, Λεύκα, Πλάτανος, Ιτιά κηάουσια, Καρυδιά, Ροδόδενητρο, Πυξός, Κομψή, Γαρδένια, Κυδωνιάστρο, Κυπαρίσσι, Ευώνυμο, Πυράκανο, Φορούθιο, Ιβίς-σκος, Άρκευθος, Ελάβνια, Αγγελική, Μυριά, Πικροδάφνη, Χαμοίριος, Φωτίνια, Λιγούστρο, Δάφνη Αποθήλιανος, Γιούκα, Κισσός, Πελοργόνιο, Γισαμί, Μυλόχορο, Σπαράγγι, Φρέζια, Λίλιουμ, Παύνια, Γλυστίνια, *Ammophila* σπ. 8) Το **Pendigan® 40SC** είναι ασφαλές κατά την εφαρμογή του γύρω και κάτω από πολλα είδη καλλιηρηγτικών (φυτά, θάμνοι, δέντρα). Ωστόσο δεν έχει διερευνηθεί η εκλεκτικότητα του σε όδες τις ποικιλίες και τα υβρίδια. Ανεπιθύμητες επιπτώσεις, όπως η φυτοτοξικότητα, μπορεί να προκύψει εξαιτίας διαφόρων περιβαρηνητικών συνθηκών, συνθηκών ανάπτυξης ή από τον τρόπο εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου. Επομένως, συστήνεται, πριν τη γενικευμένη χρήση του, η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών και η εξέτασή τους 1-2 μήνες μετά για πιθανή φυτοτοξικότητα. Μην κάνετε καθολικούς ψεκασμούς σε φυτώρια ή σε φυτά προς μεταφύτευση. Μην εφαρμόζετε το **Pendigan® 40SC** σε καλλιηρηγτικά φυτά που έχουν εμβολισθεί ή είναι σε έντονη βιοσθητική ανάπτυξη ή κατά την ανθοσφορία. 9) Μην εφαρμόζετε το **Pendigan® 40SC** σε φυτά κατά την έναρξη της ανθοσφορίας ή την πρώτη βιοσθητική ανάπτυξη. Μην επιτρέψετε τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού να πέσουν πάνω στο φύλλωμα, τους οφθαλμούς ή τα άνθη. Φροντίστε ώστε το έδαφος να μην έχει αοκασίματα ή ρωγμές που ενδεχόμενα θα επιτρέψουν την επαφή του **Pendigan® 40SC** με το ριζικό σύστημα των καλλιηρηγτικών φυτών. Όταν το ριζικό σύστημα έχει εγκατασταθεί καλά, κάνετε την εφαρμογή του **Pendigan® 40SC** πριν τον εμβολισμό ή την άνοιξη των φυτών. 10) Σε περίπτωση που κάποια είδη καλλιηρηγτικών παρουσιάζουν φυτοτοξικότητα, μην τα φυτέψετε σε έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί **Pendigan® 40SC** κατά την προηγούμενη καλλιηρηγτική περίοδο. Για φυτά που μεταφύτευονται γυμνόριζα, μην εφαρμόζετε το **Pendigan® 40SC** πριν περάσουν 2-4 εβδομάδες από τη μεταφύτευση στην οριστική τους θέση. 11) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιηρηγτικές πόσων σμασιών (αραχιά, καρτό, φακή, φάβα, ρεβύθι, κουκιά, μπίμια, σπαράγγι, ραδικί, μαιντανός, αρωματικά φυτά/φυλλά ή καλλιηρηγτικά) από τη χρήση του ακευαυμάτου. Για την χρήση πόσων σμασιών ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του ακευαυμάτου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

α) Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιηρηγτικά μέτρα κ.λπ.) ώστε να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες.

β) Εφαρμογή σε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Η ΨΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιηρηγία εκτός από τις συνιστώμενες στον ίδιο αγρό την ίδια καλλιηρηγτική περίοδο, πριν περάσουν έξι μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Να αποφεύγεται η επανεισοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Καπνός (κλήδεμα παραφυσάδων): 21 ημέρες.

Λοιπές καλλιηρηγίες: Δεν ορίζεται.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιηρηγίες και δόσεις εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική απαράβλαστη συσκευασία του, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.